

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

Α Μ Π Ε Λ Ι

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

5.

Βλαστικά στάδια στην ποικιλία σουλτανίνα

Οι πρώιμες περιοχές βρίσκονται στο στάδιο του μούρου, οι μεσοπρώιμες στην έναρξη του μούρου και οι όψιμες περιοχές στην εμφάνιση και διαχωρισμό των σταφυλιών.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: <i>Διαπιστώσεις:</i> <i>Οδηγίες:</i>	<ul style="list-style-type: none">– Οι συνθήκες που επικράτησαν μέχρι τώρα δεν ευνόησαν την ασθένεια. Ελάχιστες είναι οι προσβολές που παρατηρούνται στη φύση αλλά επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της ασθένειας.– Οι κατά τόπους σημαντικές βροχές του Απριλίου, στις περιοχές που σημειώθηκαν, εκδηλώνουν την ασθένεια σε εστίες.– Οι δροσιές του Μαΐου που συνήθως επικρατούν στις συνθήκες της Κρήτης, διατηρούν και εξαπλώνουν την ασθένεια κοντά στις εστίες εμφάνισης. Υπενθυμίζεται ότι <u>την περίοδο αυτή μπορεί να προσβάλλει κατευθείαν τα σταφύλια χωρίς απαραίτητα να εμφανίζονται συμπτώματα στα φύλλα.</u> <p><u>Στο στάδιο της άνθησης που είναι πολύ ευαίσθητο και σε περιοχές που έχει εκδηλωθεί η ασθένεια τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα.</u></p>
ΩΙΔΙΟ: <i>Διαπιστώσεις:</i> <i>Οδηγίες:</i>	<ul style="list-style-type: none">– Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.– Προσβεβλημένοι βλαστοί από μυκήλιο που διαχείμασε σε μάτια διαπιστώνονται από το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου. Νέες μολύνσεις παρατηρούνται στο φύλλωμα και <u>εξαπλώνουν περαιτέρω την ασθένεια.</u> <p>Τα στάδια άνθησης – καρπόδεσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και πρέπει να προστατεύονται. Στην άνθηση να προτιμηθεί το θειάφι σε σκόνη.</p>
ΘΡΙΠΕΣ:	Σε επιτραπέζια σταφύλια που σημειώθηκαν προσβολές την προηγούμενη χρονιά να γίνει επέμβαση στο στάδιο της άνθησης – καρπόδεσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ: Παρακαλούμε να προσθέσετε στις λίστες εντομοκτόνων του αμπελιού τη δραστική **EMAMEKTIN** (νέα έγκριση για ευδεμίδα).

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Συνέχεια στην πίσω σελίδα

Ε Λ Ι Α

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

Στις πρώιμες περιοχές ολοκληρώνεται η άνθηση της ελιάς. Οι μεσοπρώιμες περιοχές βρίσκονται στο στάδιο λίγο πριν την άνθηση (κρόκιασμα ανθέων) και οι όψιμες στο φούσκωμα των ανθέων.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ :	Η ανθόβια γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πληθυσμοί καταγράφονται στο δίκτυο παγίδευσης υψηλοί .
<i>Οδηγίες:</i>	Στις <u>μεσοπρώιμες</u> και στις <u>όψιμες περιοχές</u> συνιστάται καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη <u>στο ξεκίνημα της άνθησης</u> (να έχουν ανοίξει 5-25% των ανθέων) : <ul style="list-style-type: none">- Σε ελαιώνες <u>συμβατικής γεωργίας με μειωμένη ανθοφορία</u> (30-40% της κανονικής). <u>Ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δεν έχουν ανάγκη καταπολέμησης.</u>- Σε ελαιώνες <u>βιολογικής γεωργίας</u>, με στόχο να μειωθούν οι πληθυσμοί του εντόμου στην επόμενη γενιά, την καρπόβια.
<i>Τρόπος επέμβασης:</i>	Να προτιμηθούν σκευάσματα του βάκιλλου της Θουριγγίας που δεν βλάπτουν τα ωφέλιμα έντομα. Ο ψεκασμός με βάκιλλο πρέπει να επαναληφθεί μετά από 7-10 ημέρες. Εάν βρέξει σε διάστημα μικρότερο των 7-10 ημερών μετά τον ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.
ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ :	Οι προνύμφες προσβάλλουν την νεαρή βλάστηση. <u>Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι νεαρές φυτείες και τα φυτώρια.</u>
<i>Χρόνος επέμβασης:</i>	- Μεσοπρώιμες περιοχές : 5 - 8 Μαΐου. Για τις <u>όψιμες περιοχές</u> θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.
ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ - ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ :	Σε ελαιόδεντρα με σοβαρές προσβολές να γίνει καταπολέμηση:
<i>Χρόνος επέμβασης:</i>	- Μεσοπρώιμες περιοχές : 5 - 8 Μαΐου - Όψιμες περιοχές : 10 - 12 Μαΐου.
ΠΟΛΛΙΝΙΑ :	Προσβάλλει δέντρα παραμελημένα και εξασθενημένα. Είναι ψώρα που εγκαθίσταται κυρίως σε πληγές ή σκασιμάτα του φλοιού, στις μασχάλες των διακλαδώσεων και στους οφθαλμούς. Εμποδίζει την κανονική ανάπτυξη των οφθαλμών με αποτέλεσμα να μειώνει τη νέα βλάστηση (μικρού μήκους βλαστοί, μικροφυλλία) και να προκαλεί νέκρωση των λεπτών κλαδιών.
<i>Διαπιστώσεις:</i>	
<i>Οδηγίες:</i>	— Εξουγίανση των δέντρων με αφαίρεση των προσβεβλημένων και εξασθενημένων κλαδιών και βελτίωση της ζωτικότητας τους. — Οι χημικές επεμβάσεις συμπληρώνουν τις καλλιεργητικές φροντίδες.
<i>Χρόνος επέμβασης:</i>	Στις πρώιμες περιοχές να γίνει καταπολέμηση 5 - 8 Μαΐου και στις μεσοπρώιμες περιοχές 10 - 12 Μαΐου.
ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ (ΨΥΛΛΑ)	Καλύπτει τη νέα βλάστηση (φύλλα και ανθοταξίες) με λευκό βαμβακώδες έκκριμα. Σπάνια ζημιώνει την παραγωγή. Σε ελαιώνες με κανονική ανθοφορία δεν υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης.
<i>Οδηγίες:</i>	<u>Σε μειωμένη ανθοφορία με έντονη προσβολή (πάνω από 30% στο σύνολο των ανθέων)</u> να γίνει ψεκασμός με προσθήκη ειδικού διαβρεκτικού ώστε το φάρμακο να διαπερνά τα βαμβακώδη εκκρίματα και να φτάνει στις νύμφες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 27 Απριλίου 2012

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Γιάννης