

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

### Α Μ Π Ε Λ Ι ( Το δελτίο αμπελιού αφορά μόνο όψιμες και μεσοπρώιμες περιοχές )

Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μπαγκής

10.

Η καρπόδεση στην ποικιλία σουλτανίνα ολοκληρώθηκε και στις όψιμες περιοχές.

<b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ :</b>	Στις <b>όψιμες περιοχές</b> ξεκίνησε η δεύτερη πτήση του εντόμου με αυξημένους πληθυσμούς. Συνιστάται ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
<i>Οδηγίες:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Επιτραπέζια: <b>11 - 13 Ιουνίου</b></li><li>➤ Σταφιδάμπελα - κρασάμπελα: <b>13 - 14 Ιουνίου</b></li></ul>
<i>Τρόπος επέμβασης :</i>	Στις <b>μεσοπρώιμες περιοχές</b> η πτήση συνεχίζεται αυξημένη. Συνιστάται <u>επαναληπτικός ψεκασμός</u> στις παρακάτω ημερομηνίες: <b>Μεσοπρώιμες περιοχές :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Επιτραπέζια: <b>11 - 13 Ιουνίου</b></li><li>➤ Σταφιδάμπελα - κρασάμπελα: <b>14 - 16 Ιουνίου</b></li></ul> Ψεκασμός ή σκόνισμα. <b>Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει.</b>
<b>ΩΙΔΙΟ :</b>	Συνεχείς και σοβαρές προσβολές διαπιστώνονται στο φύλλωμα και στα σταφύλια σε αρκετά αμπέλια όλων των περιοχών. Το διάστημα που διανύουμε είναι κρίσιμο για τα σταφύλια και πρέπει να προστατεύονται. <b>Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.</b>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Συνέχεια στην πίσω σελίδα

# Ε Λ Ι Α

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

<b>ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:</b> <i>Διαπιστώσεις:</i>  <i>Οδηγίες:</i>	<p>Στις <b>όψιμες περιοχές</b> ολοκληρώνεται η καρπόδεση στην ελιά. Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη με μέτριες συλλήψεις στις όψιμες περιοχές του δικτύου παγίδευσης. Παρατηρούνται ωτοκίες στους μικρούς καρπούς.</p> <p>–Στις <b>όψιμες περιοχές</b> λόγω της ανομοιομορφίας που παρουσιάζεται φέτος στην εξέλιξη του βλαστικού σταδίου της καρπόδεσης, συστήνεται ψεκασμός κάλυψης <u>όταν το μέγεθος του καρπού είναι περίπου 3 - 5 χιλιοστά (μέγεθος κόκκου σταριού)</u>. Το έντομο δεν γεννάει σε καρπούς μικρότερου μεγέθους. Ενδεικτικές ημερομηνίες ψεκασμού: <b>13 - 15 Ιουνίου</b>.</p> <p>Στόχος της καταπολέμησης είναι η θανάτωση των προνυμφών κατά την εκκόλαψη ή λίγο μετά την εκκόλαψη. <b>Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες με μέτρια καρποφορία.</b></p>
<b>ΡΥΓΧΙΤΗΣ:</b> <b>(Μπίμπικας)</b>  <i>Ζημιές:</i>  <i>Οδηγίες:</i>	<p>Οι προσβολές του εντόμου στις <b>όψιμες περιοχές</b> αυτή την εποχή είναι περιφερειακά φαγώματα στα τρυφερά φύλλα και στις βλαστικές κορυφές από τα ενήλικα. Μετά το τέλος της καρπόδεσης τρέφονται στους καρπούς και αργότερα ωτοκούν σε αυτούς. Οι προνύμφες προσβάλουν μόνο τον πυρήνα των καρπών προκαλώντας πρόωρη καρπόπτωση το φθινόπωρο.</p> <p>Σε ελαιώνες που παρατηρήθηκαν ζημιές τα δύο προηγούμενα χρόνια και διαπιστώνονται προσβολές στο φύλλωμα, να γίνει ένας ψεκασμός των δέντρων <b>αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης</b>. Με την εκλογή κατάλληλου εντομοκτόνου (ντιμεθοείτ) γίνεται συνδυασμένη</p>
<b>ΠΟΛΛΙΝΙΑ:</b>  <i>Διαπιστώσεις:</i>  <i>Οδηγίες:</i>	<p>Είναι κοκκοειδές που εγκαθίσταται κυρίως σε πληγές ή σκασίματα του φλοιού, στις μασχάλες των διακλαδώσεων και στους οφθαλμούς. Εμποδίζει την κανονική ανάπτυξη των οφθαλμών με αποτέλεσμα να μειώνει τη νέα βλάστηση (μικρού μήκους βλαστοί, μικροφυλλία). Προσβάλει δέντρα παραμελημένα και εξασθενημένα.</p> <p>Σε ελαιώνες των <b>όψιμων περιοχών</b> που διαπιστώνονται προσβολές να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνοτρήτη επιλέγοντας ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι.</p> <p>Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με παραφινικό λάδι <u>πρέπει να είναι ποτισμένα μια εβδομάδα πριν τον ψεκασμό και η θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 32°C</u>. Η επέμβαση πρέπει να γίνεται πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.</p>
<b>ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΙ:</b>  <i>Ζημιές:</i>  <i>Οδηγίες:</i>	<p>Είναι νυχτόβια σκαθάρια που ανεβαίνουν στα δέντρα από τον κορμό τις νυχτερινές ώρες. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που κατατρώγουν περιφερειακά τα φύλλα (πριονωτά) όπως και η καρπόπτωση που συντελείται μαζί με τον ποδίσκο του καρπού.</p> <p>Όπου παρατηρούνται <u>έντονες προσβολές</u> να γίνει ψεκασμός του λαιμού και των κορμών των δέντρων με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας.</p>

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς πρέπει να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών.

Ηράκλειο 8 Ιουνίου 2012  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης  
Τρουλλάκης Γιάννης