



## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

### Α Μ Π Ε Λ Ι

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

13

<b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ:</b>	Στις <b>πρώιμες</b> και στις <b>ενδιάμεσες</b> περιοχές η τρίτη πτήση ξεκίνησε. Οι <u>προσβολές αυτής της γενιάς</u> μπορούν να προκαλέσουν <u>σοβαρές ζημιές</u> από σήψεις.
<i>Οδηγίες:</i>	Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες: <b>Πρώιμες περιοχές:</b> ➤ Επιτραπέζια: <b>5 - 7 Ιουλίου.</b> ➤ Σουλτανίνες - Οινάμπελα: <b>8 - 10 Ιουλίου.</b> <b>Ενδιάμεσες περιοχές - Κάτω Μεσσαρά:</b> ➤ Επιτραπέζια: <b>7 - 9 Ιουλίου.</b> ➤ Σουλτανίνες - Οινάμπελα: <b>9 - 11 Ιουλίου.</b>
<i>Τρόπος επέμβασης:</i>	Ψεκασμός ή σκόνισμα. <b>Το φάρμακο να καλύπτει όλα τα σταφύλια. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.</b>
<b>Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Α Κ Ι:</b>	Σε αμπέλια που παρατηρούνται προσβολές να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
<b>Ψ Ε Υ Δ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ:</b>	Στο δίκτυο παγίδευσης η πτήση των αρσενικών παρουσιάζεται αυξημένη, διαπιστώνεται δραστηριότητα του εντόμου με ωοσφόρους και εκκολάψεις κάτω από το ρυτίδωμα και παρατηρείται μετακίνηση και εγκατάσταση νυμφών προς το φύλλωμα και τα σταφύλια.
<i>Διαπιστώσεις:</i>	
<i>Οδηγίες:</i>	Σε <u>επιτραπέζια σταφύλια πρώιμων</u> και <u>ενδιάμεσων</u> περιοχών με ιστορικό προσβολών ή με εμφάνιση συμπτωμάτων (έντονη παρουσία μυρμηγκιών, κόλλα) να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.
<i>Τρόπος επέμβασης:</i>	Ψεκασμός στο φύλλωμα και στα σταφύλια. Διαβροχή μέχρι απορροής στους κορμούς και στους βραχίονες. <b>Μετά το «κλείσιμο», η καταπολέμηση του εντόμου στο εσωτερικό των σταφυλιών είναι πολύ δύσκολη.</b>
<b>Ω Ϊ Δ Ι Ο:</b>	Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα. Οι άξονες και οι μίσχοι προσβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και υποβαθμίζουν τα επιτραπέζια σταφύλια. Να συνεχιστεί η προστασία.

# Ε Λ Ι Α

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

<b>ΛΕΚΑΝΙΟ:</b>	Προσβάλει βλαστούς και φύλλα της ελιάς. Είναι κοκκοειδές (ψώρα) που ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία, συνήθως όταν το φύλλωμα είναι πυκνό. Σε περιοχές ιδιαίτερα υγρές το καλοκαίρι ή σε ελαιώνες ποτιστικούς και ακλάδευτους μπορεί να προκαλέσει έντονες προσβολές που διαπιστώνονται ως μαύρισμα στα φύλλα (καπνιά) λόγω της ανάπτυξης μυκήτων πάνω στα μελιτώματα του.
Διαπιστώσεις:	Στις <u>μεσοπρώιμες και στις όψιμες περιοχές</u> ολοκληρώνονται οι εκκολάψεις των μητρικών λεκανιών. Σε δέντρα που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές συνιστάται καταπολέμηση:
Χρόνος επέμβασης:	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Μεσοπρώιμες περιοχές : 7 - 10 Ιουλίου.</b></li><li>- <b>Όψιμες περιοχές : 12 -15 Ιουλίου.</b></li></ul>
Συστάσεις:	Το λεκάνιο έχει αρκετά παράσιτα και αρπακτικά που συνήθως κρατούν τον πληθυσμό του σε χαμηλά επίπεδα. <u>Συστήνεται να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας (fenoxycarb, παραφινικά λάδια) για την προστασία των ωφέλιμων αυτών εντόμων.</u> Οι προσβολές περιορίζονται με κατάλληλο κλάδεμα ώστε το εσωτερικό των δέντρων να λιάζεται και να αερίζεται και με την αποφυγή υπερβολικών ποτισμάτων και αζωτούχων λιπάνσεων.
<b>ΠΟΛΛΙΝΙΑ:</b>	Σε ελαιώνες των <u>όψιμων περιοχών</u> , όπου διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές, να γίνει καταπολέμηση στην ίδια ημερομηνία με το λεκάνιο ή αν συνυπάρχουν και τα δύο κοκκοειδή να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.
Οδηγίες:	Υπενθυμίζεται ότι δέντρα που πρόκειται να ψεκαστούν με παραφινικό λάδι <u>πρέπει να είναι ποτισμένα μια εβδομάδα πριν τον ψεκασμό και η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 32°C.</u>
Σύσταση:	
<b>ΑΚΑΡΕΑ:</b> (Eriophyidae)	Να γίνει άμεση καταπολέμηση σε όλες τις περιοχές για την προστασία της τρυφερής βλάστησης <u>των νεαρών δέντρων και των φυτωρίων</u> στα οποία παρατηρούνται συμπτώματα προσβολής.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς πρέπει να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών.

Ηράκλειο 3 Ιουλίου 2012  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης  
Τρουλλάκης Γιάννης