

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Μ Ε Σ Ο Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ) (Το δελτίο αφορά μόνο τις μεσοπρώιμες περιοχές)



Ευδεμίδα. Προσβολή σε νεαρή ράγα. Διακρίνεται η σπή εισόδου και τα αποχωρήματα της νεαρής προνύμφης.



Ευδεμίδα. Μία προνύμφη συνήθως χρειάζεται 1-2 ράγες για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της.



Τζιτζικάκι. Νεαρή νύμφη σε φύλλο.



Τζιτζικάκι. Ενήλικα άτομα σε φύλλο.

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής – Βαγγέλης Α. Αλατσατιανός

10.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (<i>Lobesia botrana</i>) Οδηγίες:	Στις μεσοπρώιμες περιοχές η πτήση του εντόμου συνεχίζεται με αυξημένους πληθυσμούς και οι φωτοκίες πυκνώνουν. Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ημερομηνίες: - Μεσοπρώιμες περιοχές (όπως Αρχάνες, Δαφνές, Βενεράτο, Αυγενική, Αγ.Μύρων, Κυπαρίσσι, Πρ.Ηλίας, Φοινικιά, Βαγιωνιά, Γκαγκάλες, Σοκαράς, Ασήμι, Πραιτώρια, Πύργος, Χάρακας, Μεσοχωριό, Γαρόπλα, Λιγόρτονο, Τεφέλι, Μονή Επανωσήφη, Μεταξοχώρι, Μυρτιά, Επισκοπή, Αγ.Παρασκιές, Αρκαλοχώρι, Γαζέπι Μύλος κλπ) : Επιτραπέζια: 8 - 9 Ιουνίου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 10 - 12 Ιουνίου.
Τρόπος επέμβασης:	Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.
ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp.</i>)	Σημαντικοί πληθυσμοί παρατηρούνται κατά τόπους. Σε αμπελία με προσβολές να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)	Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών. Οι καιρικές συνθήκες και τα βλαστικά στάδια των αμπελιών ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας.



Ωίδιο. Κηλίδες στην πάνω επιφάνεια χωρίς το γκριζόλευκο χνούδι.



Ωίδιο. Κηλίδες στην πάνω επιφάνεια με γκριζόλευκο χνούδι. Εμφανίζεται στα σκιαζόμενα μέρη με αυξημένη σχετ. υγρασία.



Ωίδιο. Σοβαρή προσβολή σε νεαρές ράγες, σε άξονες και μίσχους των σταφυλιών.



Ωίδιο. Προσβολές στις ράγες και εμφάνιση γκριζόλευκου χνούδιού (καρποφορίες του μύκητα).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 5 Ιουνίου 2013
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης