

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

ΣΤΑΔΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ



Πράσινη κορυφή
(C - C3)



Λευκή κορυφή
(E - E2)



Έναρξη άνθησης
(F)

ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ



Φούσκωμα
(B - C)



Πράσινη κορυφή
(C - D)



Πράσινη κλειστή ταξιανθία
(D3 - E)



Ρόδινη κορυφή
(E - E2)

Πληροφορίες: Ν.Ι.Μπαγκής - Ε.Α.Αλατσατιανός

1.

Στις ορεινές περιοχές (Λιβάδι Κρουσώνα, οροπ. Λασιθίου, Δαμάστα) στις μηλιές οι οφθαλμοί φουσκώνουν (στάδια B - C) και στις αχλαδιές επικρατεί η πράσινη κορυφή (στάδιο C3).

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (<i>Venturia inaequalis</i>) (<i>Venturia pirina</i>) (ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ) Οδηγίες:	- Κρίσιμη περίοδος για τις πρώτες μολύνσεις είναι από την πράσινη κορυφή μέχρι το στάδιο του καρπιδίου (περίπου τέλος Μαΐου). Μηλιές χωρίς πρώτες μολύνσεις δύσκολα προσβάλλονται στη συνέχεια, ακόμα κι αν υπάρχουν γειτονικά προσβεβλημένα. - Πρώτες μολύνσεις στη μηλιά γίνονται μόνο με βροχή ενώ στην αχλαδιά και με έντονες δροσιές. Σε περίπτωση πρόβλεψης βροχής κάνετε προληπτικό ψεκασμό πριν ή εφόσον βρέξει εντός 48 ωρών, με κατάλληλα μυκητοκτόνα. Επιπλέον στις αχλαδιές συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις και σε περιόδους με συχνές και έντονες δροσιές. Στην αχλαδιά οι επεμβάσεις που γίνονται για το βακτηριακό έλκος ελέγχουν και το φουζικλάδιο.
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (<i>Erwinia amylovora</i>) (ΑΧΛΑΔΙΑ) Οδηγίες:	- Το βακτήριο έχει επισημανθεί προκαλώντας οικονομική ζημιά κυρίως στην καλλιέργεια της αχλαδιάς. Ο βαθμός προσβολής ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία. Η ποικιλία κρυστάλλι είναι πιο ανθεκτική σε αντίθεση με την ποικιλία κοντούλα που είναι η πιο ευαίσθητη. - Η ασθένεια ευνοείται με ζεστό και υγρό καιρό κατά την άνθηση και το βακτήριο μεταφέρεται κυρίως με τον άνεμο, τα έντομα και τα εργαλεία. Οδηγίες: <u>Πράσινη κορυφή έως τέλος άνθισης:</u> Προληπτικοί ψεκασμοί στις αχλαδιές με εγκεκριμένα σκευάσματα. Επανάληψη ψεκασμού κάθε πέντε ημέρες.
ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ : (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	Σημαντικοί μεμονωμένοι πληθυσμοί εμφανίζονται σε μηλιές. Συνιστάται επέμβαση με θερινό πολτό και ένα εγκεκριμένο σκεύασμα στο στάδιο E2 της ρόδινης κορυφής στους οπωρώνες όπου διαπιστώνεται.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών των εχθρών και ασθενειών των μηλοειδών για το έτος 2015, τις οποίες παρακαλούμε **να κρατήσετε σε αρχείο**. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να επιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές.

Ηράκλειο 1 Απριλίου 2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη