



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Πλαστήρα 100
Ταχ. Κωδ.: 71201
Πληροφ.: Μ. Φιλίππου, Θ. Κεφαλογιάννη
Τηλεφ. 2813407920, -921
FAX : 2810 287423
Email: fytoprostatia@crete.gov.gr

Ηράκλειο 18-4-2018
Αρ. Πρωτ. : 82813

ΠΡΟΣ : 1. Φυτώρια & Κέντρα Εμπορίας Φυτών
ΠΕ Ηρακλείου
2. Καταστήματα εμπορίας φ.π.
ΠΕ Ηρακλείου
(με ηλεκτρονική αλληλογραφία)

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΑΑΤ
Δ/ση Προστασίας Φυτ. Παραγωγής
Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Email: charampatzis@minagric.gr
2. Περιφέρεια Κρήτης
- Αντ/ρχη Πρωτογενούς Τομέα, κ. Χνάρη Ε.
- Αντ/ρχη ΠΕ Ηρακλείου, κ. Κουκιαδάκη Ε.
- Δ/ση Αγρ. Οικονομίας, κ. Φωτάκη Κ.
3. Δήμος ΠΕ Ηρακλείου
4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου
Email: pkpfhgpr@otenet.gr
5. ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης
Email: geoteepk@otenet.gr
geoteepk@gmail.com

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας *Xylella fastidiosa*.

ΣΧΕΤ.: α) Το Π.Δ. 365/2002 (Α' 307), Παράρτημα Ι, Μέρος Α', Κεφάλαιο 1.
β) Η με αρ. 2015/789/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
γ) Το με αρ. 4155/26-2-2014 έγγραφό μας με τα συνημμένα του.
δ) Το με αρ. 25390/24-11-2014 έγγραφό μας με τα συνημμένα του.
ε) Το με αρ. 3924/26-3-2015 έγγραφό μας με τα συνημμένα του.
στ) Το με αρ. 6807/7-5-2015 Δελτίο Τύπου.
ζ) Το με αρ. 9021/2-6-2015 έγγραφό μας με τα συνημμένα του.
η) Το με αρ. 12219/31-7-2015 έγγραφό μας με τα συνημμένα του.
θ) Η με αρ. 2015/2417/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ι) Το με αρ. 748/15-1-2016 έγγραφό μας με τα συνημμένα του.
κ) Η με αρ. 2016/764/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
λ) Το με αρ. 2553/2-2-2017 έγγραφό μας με τα συνημμένα του.
μ) Το με αρ. 8609/2-6-2017 έγγραφό μας με τα συνημμένα του.
ν) Η με αρ. 2017/2352/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ξ) Το με αρ. 3929 /53934/12-4-2018 έγγραφο του Υπ.ΑΑΤ.

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για την εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού *Xylella fastidiosa* και μετά την παραλαβή του (ξ) σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια φυτοϋγειονομική Υπηρεσία της Ισπανίας γνωστοποίησε στην Ε.Ε. και τα Κράτη μέλη τη διαπίστωση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Xylella fastidiosa* σε ελαιώνα ηλικίας 8 ετών στην Περιφέρεια της Μαδρίτης.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός εντοπίστηκε το 2013 στην περιοχή Λέτσε της Ιταλίας, εξαπλώθηκε σε βορειότερα τμήματα της χώρας, ενώ έκτοτε υπήρξαν κρούσματα στην Κορσική, στις μεσογειακές ακτές της Γαλλίας (2015), στη Γερμανία (2016) και στις Βαlearίδες Νήσους της Ισπανίας ενώ έχει ανιχνευθεί και στην περιοχή Αλικάντε της ηπειρωτικής Ισπανίας (2017). Έως σήμερα έχει διαπιστωθεί σε πολλά είδη καλλιεργούμενων και καλλωπιστικών φυτών στις εν λόγω

περιοχές. Το βακτήριο προσβάλλει πολλά είδη φυτών μεταξύ των οποίων η ελιά, η άμπελος και τα οπωροφόρα δένδρα και η μετάδοσή του γίνεται με τη βοήθεια εντόμων (τζιτζικάκια).

Τονίζεται ότι, στη Χώρα μας δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του *Xylella fastidiosa*. Η διατήρηση της Χώρας απαλλαγμένης από το επικίνδυνο βακτήριο είναι θέμα Εθνικής Σημασίας και Ύψιστου Δημοσίου Συμφέροντος.

Επισημαίνοντας εκ νέου τους κινδύνους που εγκυμονούνται για την τοπική γεωργία από το εν λόγω βακτήριο, σας υπενθυμίζουμε τα μέτρα (φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις) που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της εξάπλωσής του στην Ένωση.

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με προηγούμενα έγγραφά μας, με την 2015/789/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (θ, κ και ν σχετικά), **επιβάλλονται** τα παρακάτω:

1. Τα φυτά-ξενιστές του βακτηρίου *Xylella fastidiosa* (ευπαθή φυτά στο βακτήριο στο έδαφος της Ένωσης) που δεν είχαν ποτέ αναπτυχθεί εντός των οριοθετημένων περιοχών, διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνο αν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Τα παραπάνω φυτά περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της Ε.Ε. που επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και την οποία μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_emergency_db-host-plants_update10.pdf

Η τελευταία έκδοση της βάσης δεδομένων της Ε.Ε. (update 10 – 15/2/2018) σας αποστέλλεται συνημμένα.

2. Ευπαθή φυτά στο βακτήριο *Xylella fastidiosa* ("συγκεκριμένα φυτά") που εισάγονται από τρίτες χώρες ή καλλιεργήθηκαν σε οριοθετημένες περιοχές της Ε.Ε., διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνο αν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Τα παραπάνω φυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα..
Τις οριοθετημένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_list-demarcated-union-territory_en.pdf

Παρακαλούνται οι διακινητές φυτωριακού υλικού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνουν την υπηρεσία μας για κάθε παραλαβή φυτών προς φύτευση προέλευσης άλλων χωρών και να μεριμνούν ώστε αυτά να συνοδεύονται από τα απαραίτητα φυτοϋγειονομικά έγγραφα. Επιπροσθέτως, βάσει του (ξ) σχετικού, σε φορτία φυτών ξενιστών του *Xylella fastidiosa* που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. στις οποίες έχει διαπιστωθεί η παρουσία του εν λόγω βακτηρίου (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία κλπ.), μετά την παραλαβή τους και οπωσδήποτε πριν τη διακίνησή τους, θα πρέπει να προηγείται επίσημη δειγματοληψία για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι για οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση συμπτωμάτων ή κάθε άλλης ανωμαλίας που αφορά τα φυτά ξενιστές του εν λόγω βακτηρίου, πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές της υπηρεσίας μας.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το *Xylella fastidiosa* (περιγραφή, συμπτώματα, έγχρωμες εικόνες), μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του επίσημου εργαστηρίου φυτοϋγειονομικών ελέγχων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου επιλέγοντας «Αρχική» και μετά «Πληροφορίες για φυτοπαθογόνα βακτήρια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.bpi.gr/section.aspx?id=3&subid=58&subsubid=2247>


Επισημαίνεται τέλος ότι φυτοϋγειονομικό διαβατήριο εξακολουθεί να απαιτείται για τη διακίνηση φυτών ή φυτικών προϊόντων Κοινοτικής καταγωγής τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V μέρος Α του ΠΔ 365/2002.

Οι Δήμοι της ΠΕ Ηρακλείου στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται να το αναρτήσουν σε πίνακες ανακοινώσεων. Τέλος, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Κρήτης παρακαλείται να ενημερώσει τα μέλη του.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Συνημμένα (4 σελίδες):

1. Η τελευταία έκδοση της βάσης δεδομένων της Ε.Ε. (update 10 – 15/2/2018).
2. Το Παράρτημα Ι της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΟΥΡΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή «στις ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές απομονώσεις» [ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΛ (L 109/56, 26.4.2016)] του συγκεκριμένου οργανισμού («συγκεκριμένα φυτά»)

<i>Acacia dealbata</i> Link [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link
<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	<i>Cytisus villosus</i> Pourr. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H. L. Wendl.	<i>Datura wrightii</i> Regel
<i>Acer</i>	<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.
<i>Aesculus</i>	<i>Digitaria insularis</i> (L.) Ekman
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	<i>Disphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clematis
<i>Alnus rhombifolia</i> Nutt.	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	<i>Duranta erecta</i> L.
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.
<i>Ambrosia</i>	<i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr.
<i>Ambrosia acanthicarpa</i> Hook.	<i>Eremophila maculata</i> F. Muell. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	<i>Erigeron bonariensis</i> L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Ambrosia trifida</i> L.	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Ampelopsis arborea</i> (L.) Koehne	<i>Eriochloa contracta</i> Hitchc.
<i>Ampelopsis cordata</i> Michx.	<i>Erodium</i>
<i>Anthyllis hermanniae</i> L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]	<i>Escallonia montevidensis</i> Link & Otto
<i>Artemisia arborescens</i> L.	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.
<i>Artemisia douglasiana</i> Hook.	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.
<i>Artemisia vulgaris</i> var. <i>heterophylla</i> (H.M. Hall & Clement	<i>Eugenia myrtifolia</i> Sims
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	<i>Euphorbia hirta</i> L.
<i>Avena fatua</i> L.	<i>Euphorbia terracina</i> L.
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	<i>Erysimum</i> [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Baccharis pilularis</i> DC.	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.)	<i>Fagus crenata</i> Blume
<i>Bidens pilosa</i> L.	<i>Ficus carica</i> L.
<i>Brachiaria decumbens</i> (Stapf)	<i>Fragaria vesca</i> L.
<i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc.	<i>Fraxinus</i> [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Brassica</i>	<i>Fraxinus americana</i> L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Bromus diandrus</i> Roth	<i>Fraxinus dipetala</i> Hook. & Arn. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Calicotome villosa</i> (Poirlet) Link [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]	<i>Fraxinus latifolia</i> Benth. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Callicarpa americana</i> L.	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.
<i>Carex</i>	<i>Genista corsica</i> (Loisel.) DC. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch	<i>Genista ephedroides</i> DC.
<i>Cassia tora</i> (L.) Roxb.	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L. A. S. Johnson
<i>Catharanthus</i>	<i>Geranium dissectum</i> L.
<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.	<i>Ginkgo biloba</i> L.
<i>Celtis occidentalis</i> L.	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	<i>Grevillea juniperina</i> L.
<i>Cercis canadensis</i> L.	<i>Hebe</i>
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	<i>Hedera helix</i> L.
<i>Cercis siliquastrum</i> L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]	<i>Helianthus annuus</i> L.
<i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Chenopodium album</i> L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]	<i>Heliotropium europaeum</i> L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	<i>Hemerocallis</i>
<i>Chionanthus</i>	<i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindl.) M. Roem.
<i>Chitalpa tashkentensis</i> T. S. Elias & Wisura [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]	<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Masters) J.D. Hooker
<i>Chitalpa tashkentensis</i> T. S. Elias & Wisura [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]	<i>Hibiscus syriacus</i> L.
<i>Cistus creticus</i> L.	<i>Hordeum murinum</i> L.
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold
<i>Cistus salvifolius</i> L.	<i>Ilex vomitoria</i> Sol. ex Aiton
<i>Citrus</i>	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth
<i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash	<i>Iva annua</i> L.
<i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don
<i>Coffea</i>	<i>Juglans</i>
<i>Commelina benghalensis</i> L.	<i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz
<i>Conium maculatum</i> L.	<i>Koelerutera bipinnata</i> Franch.
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	<i>Lactuca serriola</i> L.
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	<i>Lagerstroemia indica</i> L.
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	<i>Laurus nobilis</i> L.
<i>Cornus florida</i> L.	<i>Lavandula</i> × <i>allardi</i> (syn. <i>Lavandula</i> × <i>heterophylla</i>) [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Coronilla valentina</i> L.	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	<i>Lavandula dentata</i> L.
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	<i>Lavandula</i> × <i>intermedia</i> [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	<i>Lavandula stoechas</i> L.
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	<i>Ligustrum lucidum</i> L.
<i>Cyperus esculentus</i> L.	<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Greene
« <i>Genista</i> × <i>spachiana</i> (syn. <i>Cytisus racemosus</i> Broom)».	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.

Liriodendron tulipifera L.
Lolium perenne L.
Lonicera japonica (L.) Thunb.
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Malva
Marrubium vulgare L.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Melilotus
Melissa officinalis L.
Metrosideros
~~*Metrosideros excelsa* Sol. ex Gaertn. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]~~
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Montia linearis (Hook.) Greene
Morus
Myoporum insulare R. Br.
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Nicotiana glauca Graham
Olea europaea L.
Origanum majorana L.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Paspalum dilatatum Poir.
Pelargonium [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
~~*Pelargonium graveolens* L'Hér. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]~~
Persea americana Mill.
Phagnalon saxatile (L.) Cass. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Phillyrea latifolia L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Phoenix reclinata Jacq.
Phoenix roebelenii O'Brien
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Poa annua L.
Polygala x grandiflora nana
Polygala myrtifolia L.
Polygonum arenastrum Boreau
Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre
Polygonum persicaria Gray
Populus fremontii S. Watson
Portulaca
Prunus
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
Quercus
Ranunculus repens L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus alaternus L.
Rhus
~~*Rhus diversiloba* Torr. & A. Gray~~
Rosa californica Cham. & Schldl.
Rosa canina L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Rosa x floribunda
Rosmarinus officinalis L.
Rubus
Rumex crispus L.
Salix
Salsola tragus L.
Salvia apiana Jeps.
Salvia mellifera Greene
Sambucus
Sapindus saponaria L.
Schinus molle L.
Senecio vulgaris L.
Setaria magna Griseb.
Silybum marianum (L.) Gaertn.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY

Brescia, 15.02.2018

COMMISSION DATABASE OF HOST PLANTS FOUND TO BE SUSCEPTIBLE TO XYLELLA FASTIDIOSA IN THE UNION TERRITORY – UPDATE III

List of host plants referred to in Article 1(b) of Commission Implementing Decision (EU) 2015/2417 of 17 December 2015, which have been found to be susceptible to *Xylella fastidiosa* in the Union territory, in which a Member State has demonstrated an area with regard to only one or more subspecies of *Xylella fastidiosa* pursuant to the second subparagraph of Article 4(1) of that Decision, as having been found to be susceptible to that or those subspecies.

Host plants found to be susceptible to *Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa*

Citrus aurantium L.
Prunus avium L.
Sorbus aucuparia
Erythronium
Picea canadensis L.

Host plants found to be susceptible to *Xylella fastidiosa* subsp. *multicaulis*

Artemisia dracunculifolia Link.
Artemisia vulgaris (Labillard.) Wendl.
Aster pseudodiphyscus L.
Andropogon heterophyllus L.
Artemisia arbuscula L.
Asperula acutifolia L.
Calceolaria violacea (Pursh) Link.
Cercis siliquastrum L.
Cornus canadensis L.
Cornus paniculata L.
Cornus sericea L.

Cornus glabra L.
Cornus rubra L.
Cytisus scoparius (L.) Link.
Cytisus villosus Pursh.
Eurythra corymbosa (DC.) B. Nord.
Ficus carica L.
Fraxinus excelsior Vahl.
Gentiana apocynifolia Jacq., *Gentiana nivalis* Drouot.
Gentiana crataegi (L.) DC.
Gentiana phaeodonta DC.
Hibiscus
Helioscopia scabra (Roth) G. Don.
Leonardt angustifolia Mill.
Leonardt atrata L.
Leonardt ruscifolia L.
Leonardt x allardii (Jacq.) *Leonardt x heterophylla*
Leonardt x heterophylla
Melospiza caesia L.
Mertensia ciliata Nutt. ex Gaertn.
Myrica communis L.
Olea europaea L.
Polypodium granulosum L'Hér.
Phacelia acutifolia (L.) Cass.
Prunus americana Ehrh.
Prunus americana L.
Prunus cerasus L.
Quercus rubra L.
Rosa carolina L.
Spartium angustatum L.
Washingtonia frutescens (Willd.) Greene

Host plants found to be susceptible to *Xylella fastidiosa* subsp. *pauciflora*

Artemisia vulgaris (Labillard.) Wendl.
Asperula acutifolia L.

Cochlosiphum
Cirsium arvense L.
Cistus creticus L.
Dactylis glomerata Jacq.
Eremophila maculata F. Muell.
Eriosema cuneatum Roth.
Eriosema flavum L.
Euphorbia terracina L.
Gentiana pumila L.
Hieracium angustatum L.
Linum catharticum L.
Lotus corniculatus Mill.
Lotus corniculatus L.
Myrica carolinensis L.
Myrica carolinensis B. Br.
Olea europaea L.
Persea carolinensis L.
Phytolacca americana L.
Prunella americana (L.) L.
Rhus glabra L.
Spartanum pennsylvanicum L.
Urtica
Urtica dioica (Willd.) Drac.
Urtica dioica L.

Rhus glabra L.
Rhus glabra L.

Host plants found to be susceptible to *Xylella fastidiosa* - irrespective of the subspecies -

Colocynthis esculenta (L.) Link.
Coffea
Gentiana lutea Carthagen.
Apium graveolens L.
Lotus corniculatus L.
Veronica americana L.
Persea carolinensis L.
Prunella americana (L.) L.

